

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM DUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /UBND-NN
V/v chăm sóc, phòng trừ sâu,
bệnh lúa Hè Thu 2024

Cẩm Duệ, ngày 05 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Ban cán sự các thôn.

Đến ngày 31/5/2024 trên địa bàn toàn xã đã hoàn thành gieo cây lúa vụ Hè thu. Ngày 04/6/2024 Ban nông nghiệp xã đã kiểm tra lúa trên địa bàn 12 thôn nhìn chung cây lúa phát triển tốt mật độ lúa một số chân ruộng tương đối dày, bên cạnh đó các đối tượng sâu, bệnh đã bắt đầu phá hại đặc biệt là bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bêu vàng. Để đảm bảo cho cây lúa phát triển tốt, UBND xã đề nghị thôn trưởng các thôn hướng dẫn bà con nhân dân một số biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh như sau:

1. Phòng trừ cỏ dại: Trên một số diện tích lúa cao cạn thiếu nước, xuất hiện một số loại cỏ nhóm lá rộng, cỏ cháo, chác, lác: Đối với cỏ lá rộng sử dụng thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm muộn có hoạt chất Quinclorac hoặc Bentazone, để đảm bảo an toàn cho lúa, cần phun sau khi gieo từ 7-14 ngày trở lên, khi phun cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sử dụng thuốc trên bao bì.

2. Các đối tượng sâu, bệnh:

- **Ngộ độc hữu cơ:** Khi bệnh xuất hiện phải phun phân bón qua lá kích thích phát triển bộ rễ (như: DS80 Super, siêu ra rễ, Comcat 150WP, Antonik 1.8SL, Tora1.1SL), tháo nước phơi ruộng 2-3 ngày, sau đó cho nước vào bón phân chuồng hoại mục, làm cỏ sục bùn, bón thêm phân lân 7-8kg, 15-20kg/sào vôi bột. Khi cây lúa phục hồi ra lá xanh, có rễ màu trắng thì tiến hành chăm bón bình thường.

- **Bọ trĩ:** Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện và phun thuốc kịp thời. Dùng các loại thuốc thảo mộc để bảo vệ các thiên địch, trong trường hợp mật độ cao dùng thuốc hoá học vị độc, lưu dẫn, tiếp xúc như: Regent 800WG, Hopsan 75ND, Polytrin 440ND, Actara 25WP phun khi bọ trĩ phát sinh rõ...

- **Sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy xanh:** Hiện nay các đối tượng xuất hiện mật độ thấp, cần thường xuyên theo dõi để chủ động phòng trừ sớm đặc biệt là rầy xanh, rầy lưng trắng môi giới truyền bệnh vàng lụi và bệnh lùn sọc đen Phương Nam.

- **Ốc bèo vàng:** bà con cho nước vào ruộng ốc bèo sẽ xuất hiện tại các góc sâu trũng của ruộng lúa ta tiến hành bắt thủ công và tiêu diệt hoặc làm thức ăn cho gà vịt, diệt ổ trứng trên bờ cỏ, bờ kênh bê tông.

- **Chuột:** Hiện nay chuột gây hại vùng gần bờ, gần nương máng với tỷ lệ 2- 5% cần tập trung đồng bộ các biện pháp: Dùng bẫy bán nguyệt, bẫy lồng đặt trên đường di chuyển của chuột hoặc dùng bã sinh học đánh tập trung để nâng cao hiệu quả diệt chuột.

Nhận được công văn yêu cầu các thôn triển khai thực hiện và thông báo rộng rãi để nhân dân được biết, chủ động trong sản xuất./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND;
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND;
- 12 thôn;
- Lưu VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Văn Thành